

INSTRUCCIONES PARA EL/LA PACIENTE PARA LA RECOLECCIÓN DE HECES (Patient Instructions for Stool Collection)

Su médico ha ordenado exámenes que requieren la recolección de una muestra de heces.

- Si su doctor ha especificado que se guarde más de una muestra, no re colecciona más de una muestra en un periodo de 24 horas.
- Las muestras de heces contaminadas con bario, jabón, desinfectantes u orina no serán aceptadas.
- Se recomienda encarecidamente que usted recoja un paquete de recolección de heces (el paquete de recolección contiene tres frascos) de su proveedor o del laboratorio antes de recolectar la muestra. Puede obtener un paquete de recolección de heces en:
 - Lincoln
 - St. Elizabeth Lab, 555 South 70th St, Lincoln, NE (402) 219-8000
 - Nebraska Heart, 7500 South 91st St., Lincoln, NE (402) 489-6555
 - De su proveedor.
 - Grand Island
 - St Francis Lab, 2620 W Faidley Ave, Grand Island, NE (308) 398-3241
 - De su proveedor.
 - Kearney
 - Good Samaritan Lab, 10 E 31st, Kearney, NE (308) 865-7975
 - De su proveedor.
 - Omaha
 - CHI Health Laboratory Draw Center en Lakeside, 16909 Lakeside Hills Ct, Suite 108, Omaha, NE (402) 758-5160
 - O de su proveedor.
- Si tiene alguna pregunta sobre este procedimiento de recolección, puede llamar a nuestro departamento de Servicio al Cliente al 402-717-5227 o llame a su proveedor.
- El paquete de recolección contiene tres frascos. El líquido de los frascos es venenoso. No los beba. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si ocurre una ingestión accidentalmente, llame al Centro de Toxicología (Poison Control Center), tenga a la mano la etiqueta e información del paquete.

Por favor siga todas las instrucciones de colección cuidadosamente.

- Recolecte la muestra de heces en un recipiente de boca ancha, o puede colocar una bolsa de plástico/envoltura sobre la apertura del asiento de inodoro. Esto previene que la muestra de heces caiga dentro del inodoro. No mezcle orina o agua del inodoro con la muestra de heces.
- Cada frasco contiene una cuchara adjunta a la tapa del frasco. Usando la cuchara, coloque 1-3 cucharaditas de heces de las áreas que parecen sanguinolentas, viscosas o acuosas dentro del frasco hasta que el contenido se eleve a la línea roja. Si las heces están formadas (duras), por favor tome muestras pequeñas de cada extremo y de en medio.
- Mezcle el contenido del tubo con la cuchara, después enrosque la tapa para cerrarla firmemente y agite el contenido rigurosamente hasta que esté bien mezclado.
- Escriba su nombre, fecha de nacimiento, y la hora y fecha de recolección en cada frasco.
- Coloque los frascos en una bolsa de plásticos y envíelos a su proveedor o al Laboratorio dentro de 24 horas.

Los siguientes exámenes de heces han sido ordenados por su médico.

Por favor siga las instrucciones de recolección que se explicaron arriba y coloque una muestra de heces en el los frasco(s) apropiado(s)

CULTIVO de HECES - Enteric Plus Transport Vial

Panel GI por PCR (Tapa Verde o Anaranjada)

*Almacene la muestra a temperatura ambiente

*Entregue al laboratorio dentro de 24 horas



ANTIGENO de GIARDIA -SAF Fixative Vial

Criptosporidio (Tapa amarilla)

Examen de huevos y parásitos en las heces

*Almacene la muestra a temperatura ambiente

*Entregue al laboratorio dentro de 24 horas



C. DIFFICILE - Frasco Vacío (sin fijador)

Grasa en las Heces, Cualitativo (Tapa blanca)

SANGRE OCULTA

LEUCOCITOS FECALES *Almacene la muestra refrigerada

ANTIGENO de H. PÍLORI *Entregue al laboratorio dentro de 24 horas

SUSTANCIAS REDUCTORAS

