

Manejo de medicamentos para procedimientos gastrointestinales (incluida la colonoscopia)

Diabetes de tipo 1

- Durante la preparación intestinal:
 - Haga todas las comidas después de la administración de la insulina.
 - Reduzca la dosis nocturna de la insulina basal un 50 %.
- Si la endoscopia está programada para la **mañana**:
 - Si el paciente toma insulina basal durante la mañana, tome 50 % de la dosis habitual antes del procedimiento y tome el otro 50 % después del procedimiento.
- Si la endoscopia está programada para **después de las 12 del mediodía**:
 - Si la endoscopia está programada para la tarde y el paciente toma insulina basal al momento de acostarse, tome el 50 % la noche anterior al procedimiento.
 - Si el azúcar matutino es mayor a 180 el día de la endoscopia, tome un 10 % de la insulina basal.
 - Si el paciente toma insulina basal durante la mañana, reduzca la dosis un 50 %.
- Los pacientes retomarán su insulina después del procedimiento cuando puedan comer de nuevo.

Diabetes de tipo 2

- Suspense los siguientes medicamentos el día del procedimiento: metformina, glimepirida, glipizida, gliburida, DPP4
- Suspense SGLT2i de acuerdo al protocolo; al menos 3 días antes (consulte la lista a continuación)
- Suspense la dosis semanal de agonistas GLP-1 7 días antes de la cirugía.
 - Adminístrese insulina basal según su peso una vez al día cuando suspense los agonistas GLP-1 (10 unidades de glargina, o 0.4 unidades de glargina/kilo).
 - Contrólese el azúcar en sangre a diario (los monitores ReliON están disponibles en Walmart; Amazon tiene kits de control por menos de \$20).
- Suspense la dosis diaria de agonistas GLP-1 la mañana de la cirugía.

Lista y momentos de suspensión de SGLT2i

| Nombre genérico | Nombre de marca | Suspenda antes de la cirugía |
|--|--------------------|------------------------------|
| Bexagliflozina | Brenzavvy | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Canagliflozina | Invokana | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Canagliflozina + metformina | Vokanamet | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Dapagliflozina | Forxiga, Edistride | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Dapagliflozina + metformina | Ebymect / Xigduo | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Dapagliflozina + saxagliptina | Qtern | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Empagliflozina | Jardiance | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Empagliflozina + metformina | Synjardy | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Empagliflozina + linagliptina | Glyxambi | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Empagliflozina + linagliptina + metformina | Trijardy XR | Suspenda 3 días (72 horas) |
| Ertugliflozina | Steglatro | Suspenda 4 días (96 horas) |
| Ertugliflozina + metformina | Segluromet | Suspenda 4 días (96 horas) |
| Ertugliflozina + sitagliptina | Steglujan | Suspenda 4 días (96 horas) |
| Sotagliflozina | Inpefa | Suspenda 3 días (72 horas) |

Medicamentos para el corazón

- **Suspensión de 3 días** para cualquier SGLT2i (consulte la lista anterior)
 - *La suspensión no necesita de una autorización de un cardiólogo ya que es una recomendación del Colegio Estadounidense de Cardiología para antes de la anestesia.*

Anticoagulantes

**si consume más de un (1) anticoagulante, es necesario comunicarse con el médico que lo recetó para determinar tiempos de suspensión*

- **Suspensión de 5 días**
 - Aggrenox, Brilinta, Coumadin (warfarina, Jantoven), Effient, heparina (enoxaparina), Plavix (clopidogrel), Pletal, Ticlid.
- **Suspensión de 3 días**
 - Angiomax, Argatroban, bivalirudina, Cilostazol, lepirudina, Pradaxa, Xarelto
- **Suspensión de 2 días**
 - Elixquis (apixibán)
- **Suspensión de 12 horas**
 - Lovenox

Medicamentos para la presión arterial

- Diuréticos
 - *Es necesario comunicarse con el médico que lo recetó para determinar tiempos de suspensión*

Medicamentos dietéticos

- **Suspenda 7 días antes del procedimiento**
- Phentermine, Wegovy, Ozempic, etc

Medicamentos herbales

- **Suspenda todos los productos 7 días antes del procedimiento**
- **Suspenda todos los productos con aceite de pescado (ácidos grasos de Omega-3)**

Vitaminas

- Pueden quitarse, pero si contienen **cualquier tipo de hierro**, entonces, suspenda 5 días antes

Los medicamentos que se permiten tomar con sobros de agua la mañana anterior:

- Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (ACE, por sus siglas en inglés) (todos los que terminan con -pril ... benazepril, captopril, enalapril, lisinopril etc.)
- Bloqueadores de los receptores de la angiotensina (todos los que terminan con -sartán ... losartán (Cozaar), olmesartán (Benicar) etc)
- Bloqueadores beta (todos los que terminan con carvedilol, labetalol, metoprolol, propranolol etc.)
- Bloqueadores beta con diuréticos (bisoprolol/hidroclorotiazida, metoprolol/hidroclorotiazida, atenolol/clortalidona, etc.)
- Bloqueadores de los canales de calcio
- Glucocorticoides
- Bloqueadores alfa (Cardura, Flomax, etc)
- Agonistas alfa-2 (clonidina, etc.)
- Medicamento para la tiroides
- Antiarrítmicos (digoxina, etc.)
- Estatinas
- Medicamento para las convulsiones
- Medicamentos para la respiración, inhaladores
- Medicamentos para el reflujo gastrointestinal
- Medicamentos psicotrópicos
- Medicamentos para el dolor crónico y ansiolíticos
- Medicamentos inmunosupresores
- Tylenol/acetaminofén
- Aspirina; 81 mg o 325 mg.

Para consultas sobre el manejo de los medicamentos, llame al 402-717-9800 y seleccione la opción 1 y luego la 2.

Hello humankindness®